



Opasnost od repičine pipe

16.03.2017.

Na pojedinim mjestima pojavila se repičina pipa (*Ceutorhynchus* sp.). Savjetujemo Vam da obilazite njive i po potrebi primijenite adekvatnu zaštitu sa sistemičnim insekticidima.

Mala i velika pipa su sivkaste boje, ali se razlikuju po štetama koje prave. Mala pipa je brojnija od velike. Pojavljuje se u rano proljeće kada je temperatura preko 10 stupnjeva celzijusa. Hrani se lišćem, ali glavnu štetu čine ličinke koje buše hodnike u stabljici (velika repičina pipa) i u peteljkama i žilama (mala repičina pipa). Razvoj biljke se usporava iznad napadnutog dijela, a tkivo puca čime je otvoren put uzročnicima bolesti. Ovakve štete se javljaju kod napada velike repičine pipe dok kod male pipe koja polaže jaja u peteljke i žile listova, dolazi do žućenja i otpadanja listova što dovodi do smanjenja prinosa. Prag štetnosti kod velike repičine pipe je od 2 do 4 imaga (odrasle jedinke) na 10 biljaka, a kod male repičine pipe je 3 imaga po četvornom metru.

Za dodatne savjete nazovite naše agronome:

Danko Žakula, Zapadna Hrvatska, 099/3459-646
Slaven Suk, Istočna Hrvatska, 099/2092-220